



BUDAPESTI UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ
A SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ KÓRHÁZA
1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.
Főigazgató: Dr. Ficzer Andrea

KARDIOLÓGIA
Dr. Uzonyi Gábor
osztályvezető főorvos

E-mail: uzonyi.gabor@uzsoki.hu
Telefon: 06-1-467-3701

www.uzsoki.hu

Dobutamin stressz echocardiographia (DSE)

Stressz Echocardiographia alkalmával nem nyugalmi állapotban, hanem stressz hatása alatt vizsgáljuk a szív funkcióját. A vizsgálat célja a koszorúér betegségben a szívizom életképességének vizsgálata, illetve koszorúér betegség alátámasztása a szívizom mozgásában fellépő esetleges eltérések igazolásával. Ezeken kívül bizonyos billentyű betegségekben szükség lehet terhelés hatására vizsgálni a bal kamra pumpafunkcióját.

A vizsgálatban alkalmazott stressz hatást általában intravénás dobutamin adásával vizsgáljuk.

A vizsgálat előtti teendők:

- 2 órával a vizsgálat előtt már ne egyen, ne igyon.
- Az aznapi gyógyszereket korán reggel egy korty vízzel be lehet venni, kivéve a béta-blokkoló típusú szereket;
- 48 órával a vizsgálat előtt a béta-blokkoló, digitalis típusú gyógyszereket ki kell hagyni (ebben feltétlenül egyeztessen kardiológusával);
- kísérelővel érkezzen a vizsgálatra;

A vizsgálat kb. 30 percet vesz igénybe.

A vizsgálat utáni teendők:

- aznap már nem vezethet, ugyanis a vizsgálat során olyan gyógyszert (atropin) is kap(hat), ami átmenetileg kitágítja a pupillát, ezáltal rontja a szem fókuszáló képességétill. ill. erős szájszárazságot okozhat.