

Osztály	Vizsgálat szponzora / Neve / Protokoll	Vizsgálatvezető	Potokoll cím
Kardiológia	Bayer / ASKBIO / ASK-CHF2-CS201	Dr. Sármán Balázs	II. fázisú, adaptív, kettős vak, placebo kontrollált, randomizált, multicentrikus vizsgálat az AB-1002 intracoronáriás infúzió hatékonyságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelésére felnőtt betegeknel, akik New York-i Szívbetegséggel Foglalkozó Társaság szerinti (New York Heart Association, NYHA) III. stádiumú szívelégtelenségben és nem-iszkémiás kardiomiopátiában szenvednek
Onkológia	MSD / MK-2870-010	Dr. Mészáros Edina	Nyílt elrendezésű, randomizált, III. fázisú vizsgálat az MK-2870 egyedüli hatóanyagként, valamint pembrolizumabbal kombinációban történő alkalmazásának összehasonlítása az orvos által választott kezeléssel szemben HR+/HER2-, nem reszekábilis, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlődaganatban szenvedő résztvevőknél
	Lilly / EMBER 4 / J2J-MC-JZLH		Randomizált, nyílt, III. fázisú vizsgálat az adjuváns imlunesztrant és a standard adjuváns endokrin terápia összehasonlítására, ER+, HER2- korai emlőrák kezelésére előzőleg 2-5 évig adjuváns endokrin terápiaiban részesült betegeknel, akiknel fokozott a kiújulás kockázata
	Stemline therapeutics Inc. / ELEGANT / STML-ELA-0422L		Elacestrant, szemben a szokásos endokrin terápiával nodulus-pozitív, ösztrogén receptor-pozitív, HER2-negatív korai emlőrákban szenvedő nőknél és férfiaknál, akiknel magas a kiújulás kockázata – Globális, multicentrikus, randomizált, nyílt címkés, III. fázisú vizsgálat
	Astellas Pharma Inc. / ASTELLAS / 2693-CL-1303	Dr. Póti Zsuzsa	Randomizált, placebokontrollos, kettős vak, III. fázisú klinikai vizsgálat a fezolinetant hatásosságának és biztonságosságának értékelésére közepesen súlyos – súlyos vazomotoros tünetek (hőhullámok) kezelésében olyan, 0–3. stádiumú, hormonreceptor-pozitív emlőrákban szenvedő nőknél, akik adjuváns endokrin terápiaiban részesülnek
	Bicycle Tx Limited / Bicycle / BT8009-230	Dr. Farkas Róbert	A monoterápiaként vagy kombinált terápiaként alkalmazott BT8009 randomizált, nyílt elrendezésű, II/III. fázisú vizsgálata helyileg előrehaladott vagy áttétes urotheliális rákban szenvedő résztvevőknél
	AstraZeneca / eVOLVE / D798EC00001	Dr. Katona Csilla	III. fázisú, randomizált, nyílt elrendezésű, többközpontú, globális vizsgálat a szekvenciális kezelésként alkalmazott volrusztomig (MEDI5752) és a megfigyelés összehasonlítására nem reszekált, lokálisan előrehaladott fej-nyaki laphámsejtes daganatban szenvedő résztvevőknél, akiknek nem rosszabbodott a betegsége a definitív egyidejűleg alkalmazottradiokemoterápia után (eVOLVE-HNSCC)

Urológia	AstraZeneca / EvoPAR-Prostate01 / D9723C00001	Dr. Tóth Zoltán	Randomizált, kétkohorszos, kettős vak, placebokontrollos, III. fázisú klinikai vizsgálat az orvos által választott új hormonkészítménnyel kombinált AZD5305 értékelésére a HRR mutációt hordozó és nem hordozó, metasztatikus, kasztrációérzékeny prosztata-daganatban szenvedő betegeknél
	Bayer / Arastep / 21492		Randomizált, kettős vak, placebokontrollos III. fázisú vizsgálat a darolutamid és androgén-deprivációs terápia (ADT), valamint a placebo és ADT összehasonlítására a prosztatarák magas kockázatú biokémiai kiújulásában (BCR) érintett betegek körében.
Tüdőgyógyászat	Amgen / CodeBreak 202 /20190341	Dr. Máthé Csaba	III. fázisú, multicentrikus, randomizált, nyílt vizsgálat az első vonalbeli terápiaként alkalmazott platina-szotoraszib „doublet” kombinációs kezelés hatásosságának értékelésére platina-pembrolizumab „doublet” kombinációs kezeléssel összehasonlítva IV. stádiumú vagy előrehaladott IIIB/C stádiumú, nem laphámsejtes, nem kissejtes tüdőrákban szenvedő, PD-L1-re negatív és KRAS p.G12C mutációra pozitív betegeknél
	Bayer / SOHO-02 / 22615		III. fázisú, nyílt elrendezésű, randomizált, aktív kontrollált, multicentrikus vizsgálat a szájon át alkalmazott BAY 2927088 hatékonyságának és biztonságosságának értékelésére, összehasonlítva a standard terápiával, mint elsővonalbeli kezelés, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, aktiváló HER2-mutációkat hordozó nem kissejtes tüdőrákban (NSCLC) szenvedő betegeknél
	Lilly / Sunray-01 / J3M-MC-JZQB		Globális pivotális vizsgálat KRAS G12C mutáns, lokálisan előrehaladott vagy áttétes, nem kissejtes tüdőrákban szenvedő résztvevőknél, amelyben összehasonlítják az LY3537982 plusz pembrolizumab elsővonalbeli kezelést a placebóval plusz pembrolizumabbal szemben, azoknál, akiknél a PD-L1 expresszió $\geq 50\%$ -os, vagy az LY3537982 plusz pembrolizumab, pemetrexed, platina terápiát a placebo plusz pembrolizumab, emetrexed, platina terápiával szemben, a PD-L1 expressziótól függetlenül