

HEREELTÁVOLÍTÁS

Magas semicastratio (Daganat miatt)

Tisztelt Betegünk!

A beavatkozáshoz, amelyet Önnek tanácsolunk, az Ön beleegyezésére van szükség.


Ahhoz, hogy megfelelően dönteni tudjon a beavatkozás előtt, orvosa tájékoztatja Önt betegségéről, a vizsgálat és a beavatkozás menetéről, valamint lehetséges szövődményeiről. Ez a betegtájékoztató segít Önnek felkészülni, a fontosabb tényeket megismerni és a beavatkozással kapcsolatosan felmerülő kérdéseit előkészíteni.

Betegség:

Amennyiben a korábbi vizsgálatok (tapintás, ultrahang, tumormarkerek) az egyik oldali here rosszindulatú daganatának alapos gyanúját vetették fel, szükséges a here feltárása, illetve a daganat igazolódása esetén annak eltávolítása. Műtét nélkül elkerülhetetlen a daganat további burjánzása és terjedése. Szövetteni eredmény nélkül a kezelés megválasztása nem lehetséges, ezért későbbiekben a daganat további növekedése, áttétek képződése és terjedése halálhoz vezethet.

Beavatkozás menete:

A beavatkozás altatásban történik. Fertőtlenítőszeres lemosás után a daganatos here oldalán a lágyékhajlatnak megfelelően metszést ejtünk. Felkeressük az ondózsínórt, előemeljük, majd a hasüregbe fordulásánál lekötjük és átvágjuk. Ezt követően az ondózsínórral együtt a daganatos herét a mellékherével a herezacskóból előemeljük és eltávolítjuk. A lágyékcsatorna izombőnyéjét, illetve a sebet rétegesen zárjuk, fedőkötést helyezünk rá.



Műtéti bemetszés helye

Lehetséges szövődmények:

Műtét során lehetséges, de csak nagyon ritkán előforduló szövődmény az ondózsínórból történő erős vérzés, amelynek ellátásához akár a műtét kiterjesztésére, a műtéti bemetszés meghosszabítására lehet szükség. Utóvérzés a műtét utáni napokban is felléphet, ebben az esetben ismételt műtetre kerül sor, a vérzés ellátása végett.

Fertőzések és a seb gyógyulásának zavarai nagyon ritkák, ezek többnyire gyógyszerrel kezelhetőek, csak kivételes esetekben válhat szükségessé műtéti beavatkozás.

Utókezelés:

A műtét után, zavartalan posztoperatív szakasz esetén egy éjszakát kell kórházban tölteni. A további pihentetés a beteg otthonában javasolt. Varratszedésre és daganat miatti műtét esetén az ismételt tumormarker levételre a műtét után 7-10. napon kerül sor. Szövettani eredmény 2-4 héttel műtét után várható, ennek birtokában kezelő orvosával egyeztetik a további szükséges vizsgálatokat és beavatkozásokat. A szövettani eredmény „onkoteam” elé került. Ez egy több orvosból álló szakértői csoport, mely a betegek további kezelési stratégiájáról közösen dönt. Az onkoteam véleményét a kezelőorvos ismerteti a beteggel a műtétet követő kontroll alkalmával.

A beavatkozás, valamint az azt követő esetleges onkológiai kezelés következményeként a **nemzőképesség csökken**. Ezért a műtét előtt a betegnek javasoljuk a spermabank szolgáltatás igénybe vételét, amennyiben erre igénye van. Ez a szolgáltatás államilag nem finanszírozott.

Amennyiben további kérdése van, ill. a betegtájékoztatóban nem volt minden az Ön számára egyértelmű, kérje orvosa segítségét további felvilágosító beszélgetés keretében.

Budapest, 2020.

Dr. Tóth Zoltán
osztályvezető főorvos